

OFPPT

ROYAUME DU MAROC

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

DIRECTION RECHERCHE ET INGÉNIERIE DE FORMATION

**RÉSUMÉ DE THÉORIE
&
GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES**

MODULE

N°: 06

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

SECTEUR : CONSTRUCTION METALLIQUE

SPECIALITE : TCM

NIVEAU : TECHNICIEN

Document élaboré par :

Nom et prénom
NAE Gabriel

EFP
CDC GM

Direction
DRIF

Révision linguistique

-
-
-

Validation

- ETTAIB Chouaib

-
-

SOMMAIRE

PRESENTATION DU MODULE RESUME DE THEORIE

- I. VOCABULAIRE DE MATHÉMATIQUE*
- II. ARITHMÉTIQUE*
- III. ALGÈBRE*
 - 1. CALCULS DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES DÉCIMAUX*
 - 2. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES DANS $\mathbb{Q}$*
 - 3. PUISSANCE. RACINE CARRÉE. ÉGALITÉS FONDAMENTALES*
 - 4. ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ*
 - 5. SYSTEMES D'EQUATIONS DU 1er DEGRÉ*
 - 6. RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ*
- IV. GÉOMÉTRIE*
 - RACCORDEMENT*
 - TRIANGLE*
 - QUADRILATÈRES*
 - PROPRIÉTÉ DE THALÈS*
 - TRIANGLE RECTANGLE*
 - TRIGONOMÉTRIE APPLIQUÉE À LA MÉCANIQUE*
 - CERCLE. ARC DE CERCLE*
 - AIRE DES SURFACES PLANES USUELLES*
 - VOLUME ET MASSE D'UN SOLIDE*
 - VECTEUR*
 - EXERCICES*

MODULE 06 : MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Code :	Théorie :	30 %	29h
Durée : 96 heures	Travaux pratiques :	66 %	64h
Responsabilité : D'établissement	Évaluation :	4 %	3h

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit **mettre en application les mathématiques** selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

CONDITIONS D'ÉVALUATION

- Travail individuel.
- À partir de :
 - Consignes et directives;
 - Un cahier des charges;
 - Documents et données techniques ;
 - Données industrielles,
 - Préparations de travaux d'ateliers
- À l'aide de :
 - Une calculatrice (éventuellement programmable)
 - Formulaires, abaques et diagrammes

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

- Analyse du problème
- Lecture correcte des plans et schémas
- Méthode de travail
- Unités de grandeur
- Précision et exactitude des calculs


- Traçabilité du travail
- Exactitudes des réponses aux questions et exercices posés par le formateur

**OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT**

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU	CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE
A. Appliquer les méthodes et exactitudes des calculs	- Structuration des méthodes - Conformité des résultats
B. Utiliser les outils mathématiques permettant de traiter des problèmes de calcul de construction métallique	- Choix approprié de l’outil mathématique selon la situation - Maîtrise des études de fonction, des calculs vectoriels
C. Effectuer des calculs professionnels en atelier et sur chantier	- Choix correct des méthodes de calculs - Exactitude des calculs

--	--

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU
LE STAGIAIRE DOIT MAÎTRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ÊTRE JUGES PRÉALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE : Avant d'apprendre à <i>appliquer les méthodes et exactitudes des calculs</i> (A) : 1. Connaître certains principes de mathématiques en construction métallique 2. Se soucier des choix des formules et de la précision des réponses 3. Se soucier de la propreté et de la présentation des solutions Avant d'apprendre à <i>utiliser les outils mathématiques permettant de traiter des problèmes de calcul de Construction métallique</i> (B) : 4. Savoir utiliser une calculatrice 5. Connaître les formules de trigonométrie, surfaces, volumes,... 6. Savoir effectuer des calculs en géométrie Avant d'apprendre à <i>effectuer des calculs professionnels en atelier et sur chantier</i> (C) : 7. Savoir utiliser une calculatrice 8. Connaître les formules de trigonométrie, surfaces, volumes,... 9. Savoir effectuer des prises de cotes



MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

I. VOCABULAIRE DE MATHÉMATIQUE

Notations et Symboles	
Symbole	Définition
$\forall$	quel que soit
$\exists$	il existe
$\Rightarrow$	implique
$\Leftrightarrow$	équivalent à (= ssi : si et seulement si)
$\stackrel{\text{def}}{=}$	égal à, par définition
ie	c'est-à-dire

1. Notions relatives aux ensembles

1.1 Ensembles

Si on désigne par E un ensemble, x un élément de E , x est aussi appelé point ; on écrit :

$x \in E$ x appartient à E ;

$x \notin E$ x n'appartient pas à E ;

$\{x \in E, P\}$ ensemble des éléments x de E , ayant la propriété P (la virgule peut être remplacée par / ou par)

$F \subseteq E$ F partie (sous-ensemble de E) contenue dans E ; tout élément x de F est élément de E : $\forall x \in F \Rightarrow x \in E$;

$\subset$ est dite l'inclusion ;

$\emptyset$ ensemble vide.

$(A_i)_{i \in I}$ une famille (quelconque) de sous-ensembles de E ;

on note :

$A_1 \cup A_2$ l'union de A_1 et A_2 , est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A_1 ou (non exclusif) à A_2 ;

$A_1 \cap A_2$ l'intersection de A_1 et A_2 , est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A_1 et à A_2 ;

$\bigcup$ L'union de la famille $A_i = \{x \in E, \exists i \in I \text{ tel que } x \in A_i\}$;

$\bigcap$ L'intersection de la famille $A_i = \{x \in E, x \in A_i ; \forall i \in I\}$

2. Notions relatives aux nombres

2.1 Principaux ensembles de nombres

$\mathbb{N}$; ensemble des entiers naturels : $\{0, 1, 2, \dots\}$;

$\mathbb{Z}$; ensemble des entiers relatifs $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$;

$\mathbb{Q}$; ensemble des nombres rationnels, est ensemble des fractions : p/q avec p et $q \in \mathbb{Z}$

$\mathbb{R}$; ensemble des nombres réels ;

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; sont des ensembles ordonnés pour la relation $\leq$;

$\mathbb{C}$; ensemble des nombres complexes ;

On utilise aussi souvent les ensembles suivants :

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{Q}^+ = \{x \in \mathbb{Q}, x \geq 0\}$$

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$$

2.2 Intervalles en $\mathbb{R}$:

$$[a, b] \quad \text{fermé} = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$$

$$]a, b[\quad \text{ouvert} = \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$

$$[a, b[\quad \text{semi-ouvert à droite} = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$$

$$]a, b] \quad \text{semi-ouvert à gauche} = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$$

On désigne parfois par (a, b) l'ensemble des nombres réels compris entre a et b , bornes comprises ou non (à ne pas confondre avec le couple (a, b)).

2.3. Notation dans $\mathbb{C}$

Soit $z \in \mathbb{C}$ (un nombre complexe) ; on note :

$$z = x + iy, i = \sqrt{-1}$$

avec $x = \operatorname{Re} z$ la partie réelle de z ,

$y = \operatorname{Im} z$ la partie imaginaire de z ,

$\rho = |z|$ le module de z ; $|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$,

$\theta = \operatorname{Arg} z$ l'argument de z , défini par : $z = |z| \exp(i\theta)$,

$\bar{z}$ le complexe conjugué de z , donc $\bar{z} = x - iy$.


II. ARITHMÉTIQUE

1. Les nombres relatifs ($\mathbb{Z}$)

Comparaison de deux nombres relatifs.

- On peut graduer une droite avec des nombres relatifs.

Il est alors facile de comparer deux nombres relatifs.



- Comparaison de deux nombres de même signe

Exemple : $2 < 5$; $-5 < -2$

- Comparaison de deux nombres de signes contraires

Exemple : $-2 < 5$; $-5 < 2$; le plus petit est le négatif.

Addition

- Somme de deux nombres de même signe

Exemple : $(+5) + (+3) = +8$; $(-5) + (-3) = -8$

- Somme de deux nombres de signes contraires

Exemple : $(+5) + (-3) = +2$; $(-5) + (+3) = -2$

Opposés

Deux nombres relatifs sont opposés si leur somme est égale à zéro.

Exemple : -2 est l'opposé de 2 ; 3 est l'opposé de -3 .

Soustraction

Pour soustraire on ajoute l'opposé.

Exemple : $(+5) - (+3) = (+5) + (-3) = 2$; $(+5) - (-3) = (+5) + (+3) = 8$

Exercices :

Effectuer les additions suivantes :

$$(+28) + (+67) =$$

$$(-28) + (-67) =$$

$$(-28) + (+67) =$$

$$(+28) + (-67) =$$

Effectuer les soustractions suivantes :

$$(+35) - (+61) =$$

$$(-35) - (-61) =$$


$$(-108) - (+76) =$$

$$(+76) - (-108) =$$

2.DIVISIBILITÉ

Soient deux nombres, tels que la division du premier par le second donne pour reste ZÉRO, par exemple **45** et **9**.

Les nombres **45** et **9** peuvent donc être considérés respectivement :



- 1) Comme le dividende et le diviseur d'une division sans reste que l'on exprime en disant :
 - 45 est divisible par 9
 - 9 est diviseur de 45
 - 9 divise 45

- 2) Comme le produit de deux nombres et l'un des facteurs (9) du produit que l'on exprime en disant :
 - 45 est un multiple de 9
 - 9 est un facteur
 - 9 est un sous-multiple de 45.

Définition :

Un nombre est divisible par un autre, si la division du premier par le second se fait sans reste.

2.1. Critères de divisibilité des nombres

Définition

On appelle critères de divisibilité, une règle permettant de reconnaître, sans effectuer la division, si un nombre est divisible par, un autre nombre donné.

Par 2 : Lorsqu'il est terminé par un zéro ou par un chiffre pair.

Soit : 50 ; 42 ; 38....

Par 3 : Lorsque la somme des chiffres est divisible par 3.

Soit : 921 ; $9 + 2 + 1 = 12$; $12 : 3 = 4$

Par 4 : Lorsque les 2 derniers chiffres de droite forment un nombre divisible par 4

Soit : 1324 ; $24 : 4 = 6$

ou lorsqu'il est divisible 2 fois par 2

Soit : $68 : 2 = 34$; $34 : 2 = 17$

ou lorsqu'il est terminé par 2 zéros

Soit 1500

Par 5 : Lorsqu'il est terminé par un zéro ou par un 5

Soit 725, 940

Par 6 ; Lorsqu'il est, divisible par 2, puis par 3

Soit : $96 : 2 = 48 : 3 = 18$

Par 9 : Lorsque la somme des chiffres est divisible par 9.

Soit : 6327

$6 + 3 + 2 + 7 = 18 : 9 = 2$

2.2. NOMBRES PREMIERS

Définition

Un NOMBRE PREMIER est un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par 1 (l'unité)

1	2	3	5	7	11	13	17
19	23	29	31	37	41	43	47
53	59	61	67	71	73	79	83
89	97	101	103	107	109	113	127
131	137	143	149	151	157	163	167
173	179	181	191	193	197	199	211

2.3. Le Plus Petit Commun Multiple de plusieurs nombres est le plus petit nombre qui soit exactement divisible par ces nombres.

Comment trouver le P.P.C.M. :

Il est égal au produit de tous les facteurs premiers, communs ou non, affectés de leur plus grand exposant.

Pour trouver le P.P.C.M. de plusieurs nombres :

- 1) on les décompose en facteurs premiers.
- 2) on écrit tous les facteurs, communs ou non,
- 3) on les affecte du plus grand des exposants qu'ils possèdent dans les décompositions en facteurs premiers.
- 4) on calcule le produit de ces facteurs.

Exemple :

- Quel est le P.P.C.M. des nombres :

1260

1800

132

1260	2	1800	2	132	2
630	2	900	2	66	2
315	3	450	2	33	3
105	3	225	3	11	11
35	5	75	3	1	
7	7	25	5		
1		5	5		
		1			

- Tous les facteurs communs ou non sont

$$2 * 3 * 5 * 7 * 11$$

- On les affecte des plus grands exposants, on obtient : $2^3 * 3^2 * 5^2 * 7 * 11$

- Le P.P.C.M. est donc : $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 11 = 138600$

2.4. Le Plus Grand Commun Diviseur de 2 ou plusieurs nombres est le plus grand nombre qui les divise tous exactement.

Comment trouver le **P.G.C.D.**

Il est égal au produit des facteurs premiers communs à tous ces nombres, chacun étant affecté de son plus faible exposant.

Pour trouver le P.G.C.D. de plusieurs nombres

- 1) on les décompose en facteurs premiers,
- 2) on écrit tous ces facteurs communs,
- 3) on les affecte du plus petit des exposants qu'ils possèdent dans les décompositions en facteurs premiers.
- 4) on calcule le produit de ces facteurs.

Exemple :

Quel est le P.G.C.D. des nombres :

1260

1800

132

1 260	2	1 800	2	132	2
630	2	900	2	66	2
315	3	450	2	33	3
105	3	225	3	11	11
35	5	75	3	1	
7	7	25	5		
1		5	5		
		1			

$$1260 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$$

$$1800 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$$

$$132 = 2 \times 2 \times 3 \times 11 = 2^2 \times 3 \times 11$$

Les facteurs communs aux 3 nombres sont : **2 et 3.**

On les affecte du plus petit exposant : **2^2 et 3^1**

Un calcule le P.G.C.D. = $2 \times 2 \times 3 = 12$

Exercices :

a) Avant chacun des nombres suivants, écrivez s'il est divisible par 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 9 ou 25 :

525 :

505 :

312 :

302 :

127 :

100 :

14 :

9 :

b) Parmi les nombres suivants, entourez ceux qui sont des nombres premiers.

9 744 ; 211 ; 27 ; 69 ; 1211

181

14

125

24

151

35

215

89

1 125

45

c) Déterminez le P.P.C.M. de ces 3 nombres :

144 ; 216 ; 84

d) Déterminez le P.G.C.D. de ces 2 nombres :

1 030

1800

3. Les fractions

Définition

Une fraction est un symbole mathématique qui exprime une ou plusieurs parties d'une unité divisée en parties égales.

Exemple : $\frac{4}{5}$

Termes d'une fraction : (4/5)

4 - numérateur

5 - dénominateur

3.1. Simplification de fraction :

Pour réduire (simplifier) une fraction, il faut diviser ces 2 termes par un même nombre. (Ici par 4)

$$\frac{24}{20} = \frac{24 : 4}{20 : 4} = \frac{6}{5}$$

Particularité des fractions :

Souvent une fraction exprime une valeur inférieure ($<$) à 1.

Exemples :

$\frac{3}{4}$ baguette de pain

$\frac{1}{2}$ de litre d'eau

Mais aussi, elle peut exprimer une valeur supérieure ($>$) à 1.

Exemples : "Un magnum d'eau de 1 litre et demi" = $\frac{3}{2}$ litres

"Une baguette et demi" = $\frac{3}{2}$ baguettes

On peut aussi écrire $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

3.2. Les fractions décimales

Ce sont des fractions dans lesquels le dénominateur est 10 ; 100 ; 1 000 ; 10000 etc.

Comment transformer un nombre décimal en fraction décimale ?

$$0,251 = \frac{0,251 \cdot 1000}{1000} = \frac{251}{1000}$$

Exercices :

1) Ranger les fractions par ordre de grandeur croissante :

a) $\frac{7}{8}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{15}{8}$

b) $\frac{2}{23}$ $\frac{16}{23}$ $\frac{13}{23}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{6}{23}$ $\frac{8}{23}$ $\frac{18}{23}$

c) $\frac{8}{12}$ $\frac{8}{5}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{8}{3}$ $\frac{8}{15}$

2) Simplifier le plus possible les fractions :

$$\frac{14}{36} = \quad ; \quad \frac{112}{126} =$$

$$\frac{12}{18} = \quad ; \quad \frac{64}{312} =$$

$$\frac{54}{90} = \quad ; \quad \frac{42}{168} =$$

3) Mettre sous forme de fractions décimales les nombres suivants :

$$0,125 = \quad ; 0,2 = \quad ; 0,027 =$$

$$1,375 = \quad ; 0,6747 =$$

4) Mettre sous forme de nombres décimaux les fractions suivantes :

$$\frac{4}{1000} =$$

$$\frac{6274}{1000} =$$

$$\frac{127}{10} =$$

$$\frac{47}{100} =$$

3.3. Addition de deux fractions

Premier cas - **Fractions ayant le même dénominateur.**

Exemple :

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$$

Règle :

Pour additionner deux fractions ayant le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs entre eux et de conserver le dénominateur.

Deuxième cas - **Fractions ayant un dénominateur différent.**

Exemple :

$$\frac{2}{5} + \frac{2}{7} =$$

Il faut réduire les fractions au même dénominateur.

Procédure :

Réduire au même dénominateur c'est rechercher le P.P.C.M. de 5 et de 7.

Donc P.P.C.M. = $5 \times 7 = 35$

$$\frac{2 \cdot 7}{5 \cdot 7} + \frac{2 \cdot 5}{7 \cdot 5} = \frac{14 + 10}{35} = \frac{24}{35}$$

3.4. Soustraction de fractions

a) **Premier cas - Fractions ayant le même dénominateur.**

Exemple :

$$\frac{7}{9} - \frac{3}{9} = \frac{7-3}{9} = \frac{4}{9}$$

Différence des numérateurs

Règle

Pour soustraire deux fractions ayant le même dénominateur, il suffit de faire la différence des numérateurs et de conserver le dénominateur.

b) Deuxième cas - Fractions ayant un dénominateur différent.

Exemple :

$$\frac{7}{12} - \frac{3}{8} =$$

Il faut réduire les fractions au même dénominateur :

Procédure :

Réduire au même dénominateur c'est rechercher le P.P.C.M. de 12 et de 8.

$$12 = 2^2 \times 3$$

$$8 = 2^3$$

$$\text{P.P.C.M.} = 2^3 \times 3 = 24$$

$$\frac{7 \times 2}{12 \times 2} - \frac{3 \times 3}{8 \times 3} = \frac{14 - 9}{24} = \frac{5}{24}$$

3.5. Multiplication

Premier cas - Une fraction multipliée par un nombre.

Exemple :

$$\frac{4}{7} \times 3 = \frac{4 \times 3}{7} = \frac{12}{7}$$

Règle :

Pour multiplier une fraction par un nombre entier, il suffit de multiplier le numérateur par ce nombre et conserver le dénominateur.

Deuxième cas - Une fraction multipliée par une autre fraction.

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{1 \times 2}{3 \times 5} = \frac{2}{15}$$

Règle

Pour multiplier deux fractions entre elles, il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux.

Cas particuliers :

$$\frac{2}{7} \times \frac{3}{8} = \frac{2:2}{7} \times \frac{3}{8:2} = \frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times 3}{7 \times 4} = \frac{3}{28}$$

Avant d'effectuer les multiplications vérifier s'il n'y a pas une possibilité de SIMPLIFICATION.

3.6. Division

Premier cas : Une fraction divisée par un nombre entier.

Exemple :

$$\frac{4}{5} : 3 = \frac{4}{5 \times 3} = \frac{4}{15}$$

x
multiplication

Règle :

Pour diviser une fraction par un nombre entier, il suffit de multiplier le dénominateur par ce nombre.

Deuxième cas : Une fraction multipliée par une autre fraction.

Exemple :

$$\frac{3}{7} : \frac{1}{4} = \frac{3}{7} \times \frac{4}{1} = \frac{12}{7}$$

Règle :

Pour diviser une fraction par une autre, il suffit de multiplier la première par l'inverse de seconde.

Troisième cas : Un nombre divisé par une autre fraction.

Exemple :

$$7 : \frac{3}{5} = \frac{7}{1} \times \frac{5}{3} = \frac{35}{3}$$

Règle :

Pour diviser un nombre par une fraction on multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction.

Exercices :

a) Effectuer les différentes opérations dans les fractions suivantes :

$$\frac{5}{3} : \frac{1}{4} =$$

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{1}{4} =$$

$$\frac{12}{4} : \frac{12}{6} =$$

$$\frac{2}{17} \cdot \frac{3}{34} =$$

$$\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{6} : \frac{1}{3} =$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{7}{8} =$$

$$\frac{16}{25} \times \frac{1}{2} =$$

$$\frac{14}{3} : \frac{2}{3} =$$

$$\frac{1}{12} : \frac{1}{6} =$$

$$\left(\frac{1}{8} : \frac{3}{4} \right) \times \frac{2}{3} =$$

b) Sur un tour conventionnel, un tour de manivelle sur le chariot transversal le fera avancer de 2 mm. Sachant que le tambour gradué est partagé en 200 divisions de valeurs égales :

1. Écrire sous forme de fraction la valeur d'une graduation.

La réduire à la plus simple expression.

L'écrire sous forme décimale.

2. Je prends une passe équivalente à $\frac{3}{4}$ de tour de manivelle.

Quelle sera la valeur de la passe d'ébauche ?

3. Je reprends une passe de finition équivalent à de tour de manivelle.

Quelle sera la valeur de la passe de finition

Quelle est a valeur totale des passes (ébauche + finition)

Résultat sous forme de fraction, puis décimale.

4. Règles de trois

1) Règle de trois simple et directe

(S'applique à des grandeurs directement proportionnelles),

En 8 heures de travail un tourneur a réalisé 10 pièces.

Combien des pièces réalisera-t-il après 40 heures de travail ?

Essayons de résoudre ce problème par 2 méthodes différentes.

a) Méthode des proportions.

Le nombre des pièces est directement proportionnel au temps de travail.

Nous pouvons écrire la proportion suivante :

$$\frac{10}{8} = \frac{a}{40}$$

‘a’ étant le nombre réalisé après 40 heures de travail, le produit des extrêmes étant égal au produit des moyens, nous obtenons :

$$8 \times a = 400 ; a = \frac{400}{8} = 50$$

b) Méthode du coefficient constant de proportionnalité

Nous pouvons remarquer que le coefficient de proportionnalité est de

$$\frac{10}{8} = 1,25$$

Ce coefficient est égal au nombre des pièces réalisées dans 1 heure.

Pour 40 heures de travail, l’ouvrier réalisera :

$$1,25 \times 40 = 50 \text{ pièces}$$

2) Règle de trois simple et inverse

(S ‘applique à des grandeurs inversement proportionnelles)

En employant 10 ouvriers, un entrepreneur peut faire construire un ouvrage en 9 jours.

Combien mettrait-il de jours s’il occupait 15 ouvriers ?

Essayons de résoudre ce problème par les 2 méthodes précédentes.

a) Méthode des proportions

Nous constatons que les nombres de jours sont inversement proportionnels aux nombres d’ouvriers.

On peut écrire :

$$\frac{9}{a} = \frac{15}{10}$$

$$a = \frac{90}{15}$$

b) Méthode du coefficient constant de proportionnalité

Le produit du nombre d’ouvriers par le nombre de jours correspondants est constant.

Il est égal à $10 \times 9 = 90$

C’est le nombre de jours nécessaires à un ouvrier pour effectuer seul le travail.

On en déduit le temps mis par 15 ouvriers.

$$90 : 15 = 6$$

3) Règle de trois composée

(Elle permet de calculer une valeur d'une grandeur proportionnelle à plusieurs autres).

Exemple :

10 ouvriers travaillant 8 heures par jour construisent en 18 jours un mur de 36m de long. Combien de jours mettraient 15 ouvriers travaillant 9 heures par jour pour construire un mur semblable de 54 m de long ?

a) Méthode des proportions

Le temps est directement proportionnel à la longueur du mur, inversement proportionnel au nombre d'ouvriers et inversement proportionnel à la durée journalière du travail.

Donc :

$$\frac{a}{18} = \frac{54}{36} \times \frac{10}{15} \times \frac{8}{9}$$

$$\text{On a : } \frac{a}{18} = \frac{54 \times 10 \times 8}{36 \times 15 \times 9}$$

$$\text{On tire } a = \frac{54 \times 10 \times 8 \times 18}{36 \times 15 \times 9} = 16 \text{ jours}$$

b) Méthode de réduction de l'unité

Cette méthode conduit au raisonnement suivant :

↪ 10 ouvriers travaillant 8 heures par jour pour construire 36 m mettent : 18 jours.

↪ 10 ouvriers travaillant 8 heures par jour pour construire 1 m mettent : $\frac{18}{36}$

↪ 10 ouvriers travaillant 8 heures par jour pour construire 54 m mettent : $\frac{18 \times 54}{36}$

↪ 10 ouvriers travaillant 1 heure par jour pour construire 54 m mettent : $\frac{18 \times 54 \times 8}{36}$

↪ 10 ouvriers travaillant 9 heures par jour pour construire 54 m mettent : $\frac{18 \times 54 \times 8}{36 \times 9}$

↪ 1 ouvrier travaillant 9 heures par jour pour construire 54 m met : $\frac{18 \times 54 \times 8 \times 10}{36 \times 9}$

↪ 15 ouvriers travaillant 9 heures par jour pour construire 54 m mettent : $\frac{18 \times 54 \times 8 \times 10}{36 \times 9 \times 15} = 16 \text{ jours}$

Exercice :

La réfection d'une route doit être terminée en 26 jours et pour y parvenir, on devait employer

36 ouvriers travaillant 10 heures par jour. Mais au bout de 12 jours de travail on réduit la journée de travail à 8 heures en convenant que le salaire d'une journée de 8 heures sera les

9/10 d'une journée de 10 heures.

On demande :

1) Combien d'ouvriers faudra-t-il ajouter pour terminer l'ouvrage dans les délais prescrits ?

2) Quel était le salaire d'une journée de 10 heures sachant que le total des salaires payés a été de 23976 Euro ?

III. ALGÈBRE

1. CALCULS DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES DÉCIMAUX

a) Puissances entières de 10

10^1	10^2	10^3	10^4	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
10	100	1000	10000	0,1	0,01	0,001	0,0001

$$10^n = 10 \times 10 \times 10 \dots \times 10 = 1000 \dots 00$$

(n facteurs) (n zéros)

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,000\dots 01 \quad (n \text{ zéros})$$

Si n et p sont des entiers relatifs

$$10^n \times 10^p = 10^{n+p} \quad (10^n)^p = 10^{np} \quad \frac{10^n}{10^p} = 10^{n-p}$$

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5 \quad 10^{-3} \times 10^4 \times 10^2 = 10^{-3+4+2} = 10^3$$

$$(10^2)^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6 \quad (10^{-3})^2 = 10^{(-3) \times 2} = 10^{-6}$$

$$\frac{10^5}{10^2} = 10^{5-2} = 10^3$$

EXERCICE 2.

Calculer les nombres : $10^{-2} \times 10^3 \times 10^4 =$

$$\frac{10^{-3}}{10^{-2}} =$$

Calculer les nombres :

$$2\,327\,000\,000 \times 0,000\,032\,95 =$$

$$0,003\,583 : 259\,000\,000 =$$

b) UNITÉS DE DURÉE

a) Définition

Les durées courantes sont généralement exprimées en heures, minutes, secondes.

1 heure = 60 minutes

1 minute = 60 secondes

EXEMPLE

Calculer : $2\text{ h } 13\text{ min } 14\text{ s} + 3\text{ h } 50\text{ min } 51\text{ s} = 5\text{ h } 63\text{ min } 65\text{ s} = 6\text{ h } 4\text{ min } 5\text{ s}.$

b) Vitesse, durée, distance

La relation qui lie la vitesse v d'un mobile, la distance parcourue **d** pendant le temps t est

$$\mathbf{d = v \times t}$$

EXEMPLES

Un avion doit parcourir 3200 km. Il vole à 850 km/h. Combien de temps mettra-t-il?

$$t = \frac{3200}{850} = 3 \text{ h } 45 \text{ min } 52 \text{ s}$$

EXERCICE 3.

1) Un signal radio met 2,5 s de la terre à la terre après avoir été réfléchi par la lune (Distance terre- lune 380 000 km). A quelle vitesse se déplace-t- il?

2) Lors d'un orage on entend le tonnerre 25 secondes après avoir vu l'éclair. Sachant que le nuage se trouve à la distance de 8,5 km, déterminer en mètres par seconde, la vitesse de propagation du son dans l'air.

2. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES DANS Q

1. OPÉRATION DANS L'ENSEMBLE Q DES RATIONNELS

Un nombre rationnel est représenté par une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des entiers relatifs (b≠0).

Rationnels égaux : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ équivaut à $ad = bc$.

Addition et soustraction : $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$ et $\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$

Multiplication et quotient : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ et $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$

Rappelons que si $a \neq 0$ $\frac{a}{a} = 1$.

Pour le calcul d'additions ou de soustractions, on réduit chacune des fractions au même dénominateur.

Exercices.1

$$\text{Calculer : } a = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \quad b = \frac{5}{4} + \frac{5}{3} \quad c = \frac{3}{4} - \frac{7}{2} \quad d = \frac{6}{5} \times \frac{1}{2} \quad e = \frac{1}{2} : \frac{3}{4}$$

2) OPÉRATEURS RATIONNELS. CALCUL DE POURCENTAGES

a) Quelques définitions

- Prendre les $\frac{3}{4}$ de A c'est multiplier A par $\frac{3}{4}$
- Prendre les 7 % de A c'est multiplier A par $\frac{7}{100}$ ou 0,07.
- Soit deux grandeurs G_1 et G_2 de même nature ; si la mesure de G_1 est a et la mesure de G_2 est b, la fraction de G_1 par rapport à G_2 est le nombre $\frac{a}{b}$
- Si $\frac{a}{b} = \frac{p}{100}$, le nombre p est le pourcentage de la grandeur G_1 par rapport à G_2

b) Exemples

1. En fin d'année un fournisseur fait à ses bons clients une remise de 3,5 % sur le montant de leurs achats.

Calculer la remise sur un montant de 8 700 Dh.

La remise exprimée en Dh. est :

$$8700 \times \frac{3,5}{100} = 304,5 \text{ soit } 304,5 \text{ Dh.}$$


c) Augmentation. Diminution

Dans une ville, en 1998, 1200 élèves se sont présentés à l'examen du technicien. En 2002, il y a environ 6 % de candidats en plus. Quel est le nombre d'élèves présentés en 2002.

L'augmentation du nombre de candidats est : $1200 \times 0,06 = 72$.

Le nombre de candidats présentés en 2002 est : $1200 + 72 = 1272$.

On a réalisé le schéma suivant :



Cela revient à multiplier 1200 par 1,06. En effet :

$$N = 1200 + 1200 \times 0,06 = 1200 \times (1 + 0,06) = 1272$$

d) Possibilités d'un achat

On achète un poste de télévision 3129 Dh. On verse le 3 du montant à la commande. Le reste, après avoir subi une majoration de 10 %, sera payé en 9 mensualités égales.

1. Calculer le montant d'une mensualité.
2. A combien revient le poste de télévision ? Si on avait pu payer comptant, le marchand aurait consenti une remise de 5 % du prix marqué
3. Quelle économie aurait-on réalisé dans ce cas ?

Réponse

$$\text{On verse à la commande : } 3129 \times \frac{1}{3} = \frac{3129}{3} = 1043 \text{ Dh.}$$

$$\text{Il reste à payer : } 3129 - 1043 = 2086 \text{ Dh.}$$

$$\text{Cette somme subit une majoration de 10 \%, soit : } 2086 \times \frac{10}{100} = 2086 \times 0,1 = 208,6 \text{ Dh.}$$

Le montant d'une mensualité est

$$\frac{2086 + 208,6}{9} = \frac{2294,6}{9} = 254,95 \text{ Dh.}$$

Le poste de télévision revient à

$$3129 + 208,6 = 3337,6 \text{ Dh.}$$

$$\text{En le payant comptant, on obtient une remise de : } 3129 \times \frac{5}{100} = 156,45 \text{ Dh.}$$

$$\text{L'économie réalisée par rapport à l'achat à crédit est dans ce cas } 156,45 + 208,6 = 365,05 \text{ Dh.}$$

3. PUISSANCE. RACINE CARRÉE. ÉGALITÉS FONDAMENTALES

1. PUISSANCE D'UN NOMBRE

a) Définition et propriétés

a et b sont des nombres rationnels ; n est un entier naturel distinct de 0.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \dots \times a \times a}_{(n \text{ facteurs})}$$

L'écriture a^n se lit « a puissance n » ; n est l'exposant de a dans a^n .

$$a^n \times a^p = a^{n+p} \quad (ab)^n = a^n \times b^n \quad (a^n)^p = a^{np} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$
$$\frac{a^n}{b^p} = \begin{cases} a^{n-p} & \text{si } n > p \\ \frac{1}{a^{p-n}} & \text{si } n < p \\ 1 & \text{si } n=p \end{cases} \quad (n \text{ et } p \text{ entiers naturels}) \quad (a \neq 0)$$

Si n est un entier naturel, on pose $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

On démontre que les résultats précédents s'étendent au cas des exposants négatifs.

Exercices

A l'aide d'une calculatrice, calculer $a = (5,1)^7$

Réponse : On forme la séquence

5,1 7 On lit a = 89 741,067...

2) Calculer : $(2,7)^3 \times (2,7)^2$; $(0,45)^4 \times (0,45)^2$; $[(1,3)^2]^3$; $(3^2)^4$.

3) Calculer le nombre $\frac{2^5 \times 3^5 \times (-6)^3}{2^3 \times 3 \times (-6)}$

2. RACINE CARRÉE D'UN NOMBRE POSITIF

a) Définition et propriétés

a est un rationnel positif.

$\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré est a.

$$x = \sqrt{a} \text{ équivaut à } x^2 = a \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$\sqrt{a}$ se lit « racine carrée de a ».

Exemples

1) A l'aide d'une calculatrice, calculer $\sqrt{2,35}$

On forme : 2,35

On lit : $\sqrt{2,35} = 1,532\ 97\dots$

2) Calculer $a = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{7}}{3}$

On forme la séquence

3 $\boxed{\sqrt{x}}$ $\boxed{+}$ 7 $\boxed{\sqrt{x}}$ $\boxed{=}$ $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{=}$ On obtient : $a = 1,459\dots$

3. Exercices

1) Calculer le rayon d'un disque dont l'aire est 40 cm^2 .

2) Calculer à 0,1 près par défaut les nombres suivants :

$\sqrt{3 \times 5^2}$; $\sqrt{37 \times 4}$; $\sqrt{0,13 \times 16}$; $\sqrt{528} \times \sqrt{0,09}$ $\sqrt{\frac{38}{144}}$; $\sqrt{\frac{500}{10^4}}$

4. ÉGALITES FONDAMENTALES

a) Définition

a et b sont des nombres entiers, décimaux, rationnels ou réels.

- $\square (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $\square (a - b)^2 = a^2 - 2ab - b^2$
- $\square (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Ces relations sont utiles pour effectuer des calculs mentalement

Exemples

$31^2 = (30+1)^2 = 30^2 + 2 \times 30 \times 1 + 1^2 = 900 + 60 + 1 = 961$

b) Inégalités

- $\square$ m réel positif. Si $a \leq b$ alors $ma \leq mb$
- $\square$ m réel négatif. Si $a \leq b$ alors $ma \geq mb$

On peut le vérifier sur les exemples suivants

$-4 < 2$; $3 \times (-4) < 3 \times 2$; soit $-12 < 6$.

$-4 < 2$; $(-3) \times (-4) > (-3) \times 2$; soit $12 > -6$.

Exercice

Calculer $(2a + 3)^2$, $(a - 2)^2$ sachant que a est un réel.

Factoriser $x^2 + 3x$; $x^2 - 9$; $x^3 - 4x$; $25x^2 - 16$.

Un corps tombe en chute libre ; lâché sans vitesse au départ, il parcourt au bout du temps t exprimé en seconde,

La distance $\frac{9,81 \times t^2}{2}$, évaluée en mètres.

Déterminer la hauteur d'une chute de 1s, 2s, 3s

Combien dure une chute de 10m, 20m, 100m, 1000m.

4. GRANDEURS PROPORTIONNELLES

a) Définition

Deux grandeurs sont dites proportionnelles si les mesures correspondantes de chacune d'elles sont deux suites proportionnelles de nombres.

EXEMPLES

- Les masses et les volumes d'un même solide sont des grandeurs proportionnelles.
- La durée d'un trajet et le temps mis à le parcourir, à vitesse constante, sont des grandeurs proportionnelles.

b) Calculs pratiques

Sachant que la masse d'une tige de métal de 13 m est 1,2 kg, déterminer la masse M de 5 mètres de cette même tige.

La masse de la tige est proportionnelle à sa longueur. On a donc

Longueur (m)	Masse (kg)
13	1,2
1	$\frac{1,2}{13}$
5	$\frac{1,2}{13} \times 5$

$$M = \frac{1,2 \times 5}{13} = \frac{6}{13}$$

Soit : M = 0,462 Kg

Exercice.

Un alliage d'argent et de cuivre comprend 3,348 kg d'argent pour une masse totale de 3,600 kg. Quelle est la masse de cuivre contenue dans un lingot de 400 g formé avec cet alliage ?

5. ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

1) ÉQUATION DU TYPE : $x + b = a$

Dans R, toute équation de la forme : $x + b = a$ admet pour solution unique le nombre $a - b$.

EXEMPLES :

1. Résoudre dans R l'équation : $x + \frac{5}{3} = \frac{2}{3}$

L'équation s'écrit :

$$x = \frac{2}{3} - \frac{5}{3} \quad \text{soit} \quad x = \frac{-3}{3} = -1$$

La solution est le nombre -1.

Exercice 1. Résoudre dans R les équations : $x - 2 = 5$; $x + \frac{3}{2} = 1$; $x - \frac{4}{5} = \frac{2}{3}$

2) ÉQUATION DU TYPE : $ax = b$

Dans R, toute équation de la forme : $ax = b$ ($a \neq 0$)

admet pour solution unique le nombre : $\frac{b}{a}$

Exemple

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{3}{4}x = -\frac{2}{5}$

L'équation s'écrit : $x = \frac{-\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}}$ soit $x = \left(\frac{-2}{5}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right) = \frac{-8}{15}$

La solution est le nombre $\frac{-8}{15}$

Exercice.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

$$\frac{2}{3}x = 5 ; \frac{1}{2}x = \frac{2}{3}$$

APPLICATION À LA RÉOLUTION DES PROBLÈMES

1 PREMIER PROBLÈME

Calculer la petite base d'un trapèze rectangle dont les mesures en cm de l'autre base et de la hauteur sont respectivement 52 et 35. L'aire en cm^2 de la surface est 1365.

Choix de l'inconnue : désignons par x la mesure en cm de la petite base.

Mise en équation du problème

Sachant que l'aire S est :

$$S = \frac{h(B+b)}{2}$$

on obtient

$$1365 = \frac{35(52+x)}{2}$$

Résolution de l'équation

En multipliant les deux membres par 2, on a

$$2730 = 35 \times 52 + 35X$$

$$35X = 2730 - 1820$$

$$X = \frac{910}{35} = 26$$

La mesure en cm de la petite base du trapèze est 26.

2 DEUXIÈME PROBLÈME

Le prix d'un objet est diminué de 13,30 Dh quand le commerçant fait au client une remise de 7 %.

Quel est le prix de vente de l'objet ?

Combien le client l'a-t-il payé ?

Choix de l'inconnue : x représente le prix de vente de l'objet évalué en dirhams.

Mise en équation du problème

Donc

Résolution de l'équation :

La remise faite au client est $\frac{7}{100}x$ ou 13,3

Donc : $\frac{7}{100}x = 13,3$

$7x = 13,30 \times 100$ et $x = \frac{1330}{7} = 190$

Le prix de l'objet est 190 Dh.

Le client l'a payé : $190 - 13,30 = 176,70$ Dh.

Exercices :

- 1) Dans une entreprise on emploie 240 ouvriers ; il y a quatre fois plus d'hommes que de femmes. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes dans cette entreprise ?
- 2) La T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée) étant au taux de 18,6 %, Combien payez-vous un objet dont le prix hors taxe est 135 Dh? Quel est le prix hors taxe d'un objet que vous payez 150 Dh?
- 3) Calculer le côté d'un carré sachant que si on augmente de 5 m l'un des côtés et si l'on diminue de 3 m l'autre côté, on obtient les côtés d'un rectangle ayant la même aire que celle du carré.
- 4) Calculer la hauteur à donner à une pièce cylindrique pour que le volume soit 1 000 cm³, le rayon de base ayant pour valeur en cm
2; 4; 6; 8; 10; 12. On utilisera la formule $V = \pi R^2 h$.

6. SYSTEMES D'EQUATIONS AU 1^{ER} DEGRÉ

1) Équation du 1^{er} degré à 2 inconnues

a) Définition

Résoudre l'équation $2x - y = -1$ c'est déterminer l'ensemble S de tous les couples de réels (x, y) qui vérifient l'équation.

b) Résolution de l'équation $2x - y = -1$

Pour tout couple de réels (x, y) l'équation (1) est équivalente à $y = 2x + 1$

Pour obtenir les solutions il suffit de donner une valeur arbitraire à x et déterminer la valeur correspondante de y. Ainsi

x	1	- 1	2	3	4	0,5	0,25	m
y	3	-1	5	7	9	2	1,5	2m + 1

(1; 3); (-1; -1); (2; 5); (3; 7); (4; 9); (0,5; 2); (0,25; 1,5);..... (m; 2 m + 1) sont des solutions de l'équation.

On écrit :

$$S = \{(m; 2m + 1); m \in (\mathbb{R})\}.$$

2) Système de 2 équations du 1^{er} degré

Résoudre le système des deux équations

$$\begin{cases} 2x - y = 4 & (E1) \\ 3x + 2y = -1 & (E2) \end{cases}$$

c'est trouver toutes les solutions communes aux deux équations qui le composent.

a) Méthode de résolution par substitution

A l'aide d'une équation, on exprime une inconnue en fonction de l'autre ; puis on substitue l'expression obtenue dans l'autre équation.

Soit à résoudre le système

$$\begin{cases} 2x - y = 4 & (1) \\ 3x + 2y = -1 & (2) \end{cases}$$

De l'équation (1) on obtient : $y = 2x - 4$. (3)

En remplaçant dans (2), on a

$$3x + 2(2x - 4) = -1$$

$$3x + 4x - 8 = -1 \Rightarrow 7x = 7 \quad \text{soit } x = 1.$$

En remplaçant dans l'équation (3), x par 1, on trouve

$y = 2 - 4 = -2$. Donc, nécessairement : $x = 1, y = -2$.

Vérifions que le couple $(x=1, y=-2)$ est bien solution du système :

$$2 \times 1 - (-2) = 2 + 2 = 4$$

$$3 \times 1 + 2 \times (-2) = 3 - 4 = -1.$$

On conclut que la solution du système est le couple $(1; -2)$.

$$S = \{(1; -2)\}$$

b) Méthode de résolution par combinaison linéaire

Opérons différemment pour résoudre le système

$$\begin{cases} 2x - y = 4 & (1) \\ 3x + 2y = -1 & (2) \end{cases}$$

Les coefficients de y sont -1 et 2. On peut obtenir des coefficients opposés en multipliant les deux membres de l'équation (1) par 2. On obtient :

$$\begin{cases} 4x - 2y = 8 & (3) \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$$

On élimine l'inconnue y en ajoutant (3) et (2), soit

$$4x + 3x = 8 - 1$$

$$7x = 7$$

$$x = 1.$$

En remplaçant x par 1 dans l'équation (1), on obtient

$$2 - y = 4 \quad \text{soit } y = -2.$$

Donc nécessairement : $x = 1, y = -2$.

On vérifie comme précédemment que le couple $(x = 1; y = -2)$ est solution du système.

Donc :

$$S = \{(1; -2)\}$$

Exercice.

Résoudre le système

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - 2y = 3. \end{cases}$$

7. RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

a) Cas général

Soit l'équation du second degré : $ax^2 + bx + c = 0$. ($a \neq 0$) (1)

On démontre et on admettra que :

- Si $b^2 - 4ac > 0$, les solutions de (1) sont :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Si $b^2 - 4ac = 0$, la solution de (1) est $-\frac{b}{2a}$

- Si $b^2 - 4ac < 0$, l'équation n'a pas de solution.

Le nombre $(b^2 - 4ac)$ est appelé discriminant de l'équation.

b) Application .

En utilisant les formules de résolution, résoudre les équations $x^2 - 6x + 8 = 0$

Cette équation est de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a = 1$, $b = -6$, $c = 8$.

$b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 36 - 32 = 4$. Il y a donc des solutions données par

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{6 - \sqrt{4}}{2} = \frac{6 - 2}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{6 + \sqrt{4}}{2} = \frac{6 + 2}{2} = 4$$

donc : $S = \{2, 4\}$.

Exercices

1) Résoudre les équations :

- $x^2 + 2x + 5 = 0$.
- $x^2 - 3x + 2$

2). Un corps étant abandonné à lui-même tombe et parcourt en t secondes une distance y égale à $4,9 t^2$ mètres.

- Représenter graphiquement la fonction : $t \rightarrow 4,9 t^2$.
- Déterminer le temps mis pour parcourir 176.4 m.
- Trouver la profondeur d'un puits de mine sachant qu'une pierre lâchée à l'origine de ce puits tiret 7 secondes pour atteindre le fond.

3). Un cylindre a une hauteur de 40 cm et un rayon de base égal à x cm.

- Exprimer la relation qui lie le volume V et le rayon x .
- Étudier et représenter graphiquement la fonction f tel que $V = f(x)$ lorsque x varie de 0 à 5 cm.

4). Dans un conducteur électrique de résistance 5 ohms on fait passer un courant d'intensité i ampères. La quantité de chaleur dégagée par le courant est donnée en joules par :

$$Q = 5 \times i^2 \times 60.$$

- Calculer la quantité de chaleur dégagée en une minute par le conducteur si l'on fait passer un courant de 0,1 A; 0,2 A; 0,3 A; 0,4 A; 0,5 A.
- Tracer le graphique de la fonction f définie par $Q = f(i)$ quand i varie de 0 à 0,5.

5). Calcul mental

- On donne $f(x) = x^2 + x$, calculer $f(1), f(2), f(3), f(4), f(10), f(-1)$
- On donne $f(x) = x^2 - x$, calculer $f(1), f(2), f(3), f(4), f(10), f(-1)$.

IV. Géométrie

Droite / Demi-droite / Segment


Une **ligne droite** est infinie

Une ligne droite est désignée par une lettre majuscule


Exemple : droite **D**

ou 2 lettres minuscules

Exemple : droite **xy**




Une **demi-droite** est limitée à une extrémité (origine) par un point



Elle est désignée par son origine et une lettre minuscule

Exemple : demi-droite **Az**

Un **segment de droite** est limité aux deux extrémités



Un segment est désigné par les points qui le limitent.



Exemple : segment **AB**

Attention


*On dit très souvent droite **AB** à la place de segment **AB**.*

Droites parallèles

Des droites sont parallèles lorsqu'elles ne se coupent jamais.



La distance entre 2 droites parallèles est toujours la même.



Si une première droite est parallèle à une deuxième droite,
et si cette deuxième droite est parallèle à une troisième droite,
alors la première droite est parallèle à la troisième droite.




La droite **E** est parallèle à la droite **F**

La droite **F** est parallèle à la droite **G**

DONC La droite **E** est parallèle à la droite **G**

Droites perpendiculaires

Une droite est perpendiculaire à une autre droite lorsqu'elle forme entre elles 4 angles égaux.




La droite xy est perpendiculaire à la droite wz .

L'angle

Un **secteur angulaire** est la partie délimitée par deux demi-droites ayant la même origine.


L'**angle** correspond à l'**écartement** des deux demi-droites qui délimitent le secteur angulaire.



On appelle **O** le **sommet** de l'angle

On appelle **Ox** et **Oy** les **côtés** de l'angle

On le note : angle $\widehat{xOy}$




Notez bien :

L'angle est une grandeur que l'on peut mesurer.


Mesurer un angle c'est mesurer son écartement, qu'on appelle son amplitude.

Angles complémentaires / Angles supplémentaires

Deux angles sont complémentaires si leur somme égale l'angle droit (90°).




$\widehat{xOz}$ est un angle droit donc $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont complémentaires.




$\widehat{man} + \widehat{rB1} = 28^\circ + 62^\circ = 90^\circ$
donc $\widehat{man}$ et $\widehat{rB1}$ sont complémentaires.

Deux angles sont supplémentaires si leur somme égale l'angle plat (180°).




$\widehat{xOz}$ est un angle plat donc $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont supplémentaires.



$\widehat{tAu} + \widehat{uBw} = 71^\circ + 109^\circ = 180^\circ$
donc $\widehat{tAu}$ et $\widehat{uBw}$ sont supplémentaires.

Angles adjacents / Angles opposés par le sommet

Deux angles sont adjacents s'ils ont le sommet commun et un côté commun.




Le sommet **O** est commun à l'angle $\widehat{XOY}$ et à l'angle $\widehat{YOZ}$

Le côté **OY** est commun à l'angle $\widehat{XOY}$ et à l'angle $\widehat{YOZ}$

Les angles $\widehat{XOY}$ et $\widehat{YOZ}$ sont adjacents.

Deux angles sont opposés par le sommet si leur sommet est commun et leurs côtés sont dans le prolongement les uns des autres.



Le sommet **O** est commun à l'angle $\widehat{XOY}$ et à l'angle $\widehat{UOW}$

Le côté **Ox** se prolonge par **Oy**

Le côté **Ou** se prolonge par **Ow**

Les angles $\widehat{XOY}$ et $\widehat{UOW}$ sont opposés par le sommet.

NB : Les angles $\widehat{XOW}$ et $\widehat{UOY}$ sont aussi opposés par le sommet.


Deux angles opposés par le sommet ont la même amplitude, ils sont égaux.

Les angles $\widehat{XOW}$ et $\widehat{UOY}$ sont égaux.

Les angles $\widehat{XOY}$ et $\widehat{UOW}$ sont égaux.

Cas d'une droite sécante à deux droites parallèles. Apparaît alors la notion d'angles alternes internes, d'angles alternes externes et d'angles correspondants.

- Angles alternes internes




$$\hat{A} = \hat{A'}$$

$$\hat{B} = \hat{B'}$$

$$\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$$

- Angles alternes externes




$$\hat{A} = \hat{A'}$$

$$\hat{B} = \hat{B'}$$

$$\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$$

- Angles correspondants




$$\hat{A} = \hat{A'}$$

$$\hat{B} = \hat{B'}$$


$$\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$$

Exercices :

- Donnez le nom des angles repères A.



$\hat{A}$ est un angle _____







$\hat{A}$ est un angle _____

- Examinez successivement les figures A ; B ; C ; D.

Les angles 1 et 2 sont-ils adjacents ?


Justifiez votre réponse.



Les angles


Les angles $\widehat{AEC}$ et $\widehat{BED}$ sont dits : _____

Ils sont : _____



Les angles $\widehat{ADB}$ et $\widehat{BDC}$ sont dits : _____

$\widehat{CDA}$ est un angle _____




Les angles $\widehat{FHE}$ et $\widehat{GHF}$ sont dits : _____

$\widehat{GHF}$ est un angle _____


$\widehat{FHE}$ est un angle _____

$\widehat{GHE}$ est un angle _____



Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux côtés de l'angle droit.




$$\overline{CB^2} = \overline{AB^2} + \overline{AC^2}$$

$$\overline{CB} = \sqrt{\overline{AB^2} + \overline{AC^2}}$$

Donc : $a^2 = b^2 + c^2$; $5^2 = 3^2 + 4^2$

Exercices :

1)




Soit le triangle ci-dessus, calculez **a**.

2) Calculez la diagonale et la surface d'un rectangle dont la longueur mesure 8 cm et la largeur 7 cm.


3) L'hypoténuse d'un triangle mesure 41 cm et un côté de l'angle droit mesure 24 cm.

Calculez l'autre côté.


- Calculez le périmètre et la surface




- Calculez le périmètre et la surface.



- Calculez le périmètre et la surface




Cercle trigonométrique



C'est un cercle de rayon $R = 1$ par définition construit sur deux axes dirigés et dans lequel on se propose de mesurer des angles par des segments rectilignes, portés par des axes et appelés lignes trigonométriques.

Les deux axes principaux passent par l'origine O et ils sont limités de -1 à $+1$.




Deux autres axes sont construits respectivement tangent au cercle à l'abscisse $+1$ et à l'ordonnée $+1$. Ils ne sont pas limités.

Sens trigonométrique

C'est le sens de rotation adopté pour inscrire un angle à l'intérieur du cercle.

C'est le sens inverse de celui d'une horloge.

Mesure des angles




On sait qu'un angle peut être caractérisé par un nombre exprimant sa mesure en degré, en grade, en radian.

Mais dans le cercle trigonométrique de rayon $R = 1$ un angle $\hat{a}$ peut aussi être défini par une mesure linéaire exprimée dans la même unité que celle choisie pour le rayon (sinus, cosinus ou tangente).

RACCORDEMENT

1) RACCORDEMENT DE DEUX DROITES PAR UN CERCLE

a) Premier cas : les droites données D et D' sont parallèles



Construction.

Une droite l perpendiculaire à D et D' coupe D en A et D' en A' ; on construit le milieu de [AA'] et on trace le cercle de diamètre [AA'].


Justification.

D et D' sont perpendiculaires au diamètre [AA'] ; elles sont donc tangentes au cercle.

b) Second cas : raccorder deux droites concourantes par un cercle de rayon donné r

Construction.


On mène deux parallèles à l_x et $l_{x'}$ à la distance r ; ces droites se coupent en O ; on projette orthogonalement O sur l_x et $l_{x'}$; le cercle de centre O et de rayon OT est le cercle cherché.



Justification.

$OT = OT' = r$ et $(OT) \perp (l_x)$ et $(OT') \perp (l_{x'})$

2) RACCORDEMENT D'UNE DROITE ET D'UN CERCLE PAR UN CERCLE DE RAYON DONNÉ



Soit une droite D et un point O dont la distance à D est égale à 4 cm. Raccorder le cercle C de centre O, de rayon R égal à 3 cm et la droite D par un cercle C' de rayon R' égal à 2 cm.

Construction.

Le centre O' du cercle C' appartient à la droite D' menée parallèlement à D à une distance d égale à 2 cm et au cercle C, de centre O et de rayon R, égal à $R + R'$ soit 5 cm.


Les points de contact sont A, intersection de [OO'] avec C et B, projection orthogonale de O' sur D.

Il existe quatre raccordements possibles : deux qui sont symétriques par rapport à (OO') et deux autres symétriques des précédents par rapport à la perpendiculaire menée de O à D.

3) RACCORDEMENT DE DEUX CERCLES PAR UNE DROITE

a) Tangentes communes extérieures à deux cercles

Considérons les cercles C (O,R) et C' (O',R') et supposons $R > R'$.




Le cercle de diamètre [OO'] coupe le cercle C'' de centre O et de rayon $R - R'$ en A et B. Les droites (O'A) et (O'B) sont tangentes à C''.

Les demi-droites OA et OB coupent le cercle C en U et V. La parallèle à (O'A) menée de U est tangente au cercle C' en U'. De même la parallèle à (O'B) menée de V est tangente au cercle C' en V'.

b) Tangentes communes intérieures à deux cercles

Considérons les cercles C(O, R) et C'(O', R')




Le cercle de diamètre [OO'] coupe le cercle C''(O, $R + R'$) en A et B. La parallèle menée de U à (O'A) est tangente en U' au cercle C'. De même, la parallèle menée de V à (O'B) est tangente en V' au cercle C'.

Si O' est extérieur au disque D'' (O, $R + R'$), c'est-à-dire si $OO' > R + R'$, il existe donc deux tangentes communes intérieures à C et C'.

4) RACCORDEMENT DE DEUX CERCLES PAR UN CERCLE DE RAYON DONNÉ

Noter deux points O et O' tels que $OO' = 7$ cm. Tracer le cercle C de centre O, de rayon R égal à 3 cm et le cercle C' de centre O', de rayon R' égal à 2 cm. Raccorder ces deux cercles par un cercle C'' de rayon R'' égal à 3 cm.



Le centre O'' du cercle C'' est tel que :


$$O''O = R+R'' = 6 \text{ cm et } O''O' = R'+R'' = 5 \text{ cm.}$$

Il est donc commun aux cercles $C_1 (O, R+R'')$ et $C_2 (O', R'+R'')$.

Les points de contact sont A, intersection de C et de $[OO'']$ et B, intersection de C' et de $[O'O'']$.


EXERCICES

1. La section d'une canalisation a la forme indiquée ci-dessous.



Deux axes de cercle de rayons respectivement égaux à 25 mm et 10 mm sont raccordés par deux droites. Représenter cette section à l'échelle 1.


2. Dessiner à l'échelle 0,25 la section du réservoir représentée par la figure ci-dessous (cotes en mm).



FIGURES USUELLES TRIANGLES

1) DROITES REMARQUABLES


Médiatrices ; cercle circonscrit



O point d'intersection des médiatrices est le centre du cercle circonscrit

$$OA = OB = OC$$


Bissectrices ; cercle inscrit



I point d'intersection des bissectrices est le centre du cercle inscrit


$$IH = IK = IL$$

Hauteurs ; orthocentre



H point d'intersection des hauteurs est appelé orthocentre du triangle.

Médianes ; centre de gravité



G point d'intersection des médianes est appelé centre de gravité du triangle





$$GA = 2GA'$$

Exercice.

Construire un triangle ABC tel que $BA = 4 \text{ cm}$; $BC = 5 \text{ cm}$; $\hat{A}BC = 115^\circ$.

Construire l'orthocentre.

2) ANGLES D'UN TRIANGLE. TRIANGLES PARTICULIERS

<u>Somme des angles</u>  $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$	<u>Triangle isocèle</u>  La médiatrice de [BC] est axe de symétrie du triangle. $AB = AC ; \hat{B} = \hat{C}$
<u>Triangle équilatéral</u>  Les médiatrices sont axes de symétrie $AB = BC = CA ; \hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ$	<u>Triangle rectangle</u>  hypoténuse : [BC] ; O milieu de [BC] $OA = OB = OC$ $\hat{A} = 90^\circ ; \hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$

EXEMPLES

1. Soit un triangle ABC tel que $\hat{A} = 37^\circ$ et $\hat{B} = 68^\circ$; $\hat{C}$ est tel que $37 + 68 + \hat{C} = 180$
D'où $\hat{C} = 180 - (37 + 68) = 75^\circ$.

2. Un triangle isocèle ABC est tel que $AB = AC$ et $\hat{B} = 42^\circ$; calculons $\hat{C}$ et $\hat{A}$


$AB = AC$ donc $\hat{B} = \hat{C} = 42^\circ$

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180$ soit $\hat{A} + 84 = 180$

D'où : $\hat{A} = 180 - 84 = 96^\circ$.

3. Triangle rectangle isocèle.

Soit un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = AC$; il est tel que $\hat{A} = 90^\circ$; $\hat{B} = \hat{C} = 45^\circ$.



Exercice 2. Un triangle ABC rectangle en A est tel que $\hat{B} = 26^{\circ}30'$; calculer $\hat{C}$.

QUADRILATÈRES

1) PARALLÉLOGRAMME ET LOSANGE

Parallélogramme - les diagonales se coupent en leur milieu ; - les côtés opposés sont parallèles et de même longueur ; - les angles opposés ont même mesure ; - les angles consécutifs sont supplémentaires.	
Losange - les côtés ont même longueur ; - c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires	


2) RECTANGLE ET CARRÉ

Rectangle - les quatre angles sont droits ; - les diagonales se coupent en leur milieu et ont même longueur ; - le rectangle possède deux axes de symétrie.	
Carré - les quatre côtés ont même longueur ; - les quatre angles sont droits ; - les diagonales se coupent en leur milieu elles ont même longueur et sont perpendiculaires ; - le carré possède quatre axes de symétrie.	

3) TRAPÈZE

C'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles ; les côtés parallèles sont les bases du trapèze ; h désigne la hauteur.



Si l'un des angles du trapèze est droit, ce trapèze est un trapèze rectangle.



PROPRIÉTÉ DE THALÈS

1. Propriété de Thalès et conséquences

Les points A, B, C, D de la droite Δ se projettent parallèlement à d sur la droite Δ' en A', B', C', D'.




$$\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$$

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'D'}{CD}$$

2. Application au triangle

Si les droites (BC) et (B'C') sont parallèles alors




$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

Les triangles ABC et AB'C' sont dits homothétiques

EXEMPLES

1. Les droites (AB) et (CE) sont parallèles ; calculer x et y.



Calcul de x.

$$\frac{DC}{DE} = \frac{BC}{AE} \quad (\text{Conséquence de la propriété de Thalès})$$

$$\text{soit : } \frac{x}{60} = \frac{20}{24} \quad \text{d'où : } 24x = 60 \times 20$$

$$x = \frac{60 \times 20}{24} = 5 \times 10 = 50$$

Calcul de y.


Les triangles DCE et DBA sont homothétiques

$$\text{Donc : } \frac{CE}{AB} = \frac{DE}{DA} \quad \text{soit : } \frac{y}{28} = \frac{60}{84}$$

$$\text{D'où : } 84y = 60 \times 28; \quad y = \frac{60 \times 28}{84} = 20$$


EXERCICE .

Les droites (DE) et (BC) sont parallèles ; calculer x et y.



TRIANGLE RECTANGLE

1) RELATIONS MÉTRIQUES



Considérons un triangle ABC rectangle en A ; H désigne le pied de la hauteur issue de A.
On peut écrire :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \text{ (relation de Pythagore)}$$

$$BA^2 = BH \times BC \text{ et } CA^2 = CH \times CB$$

$$HA^2 = HB \times HC$$


$$HA \times BC = AB \times AC.$$

Étant donné un triangle ABC

- si $AB^2 + AC^2 = BC^2$ alors ce triangle est rectangle en A;
- si $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$ alors ce triangle n'est pas rectangle en A.

2) APPLICATION

Soit le triangle ABC rectangle en A; calculer AH, AB et AC



Calcul d'AH.

Dans le triangle rectangle ABC

$$AH^2 = HB \times HC \quad \text{soit } AH^2 = 15 \times 64 \quad \text{d'où } AH = \sqrt{15 \times 64} = 8\sqrt{15}$$

$$AH = 30,98$$

Calcul d'AB et AC.

$$BA^2 = BH \times BC \quad \text{soit : } BA^2 = 15 \times 79 = 1185 \quad \text{d'où : } BA = \sqrt{1185}$$


$$BA = 34,4$$

$$CA^2 = CH \times CB \quad \text{soit : } CA^2 = 64 \times 79 = 5056 \quad \text{d'où : } CA = \sqrt{5056}$$

$$CA = 71,1.$$

Exercice.


Calcul de la cote d'une clavette disque.



En notant que le triangle HAK est inscrit dans un demi-cercle, donc est rectangle, calculer AB.

3) DIAGONALE DU CARRÉ. HAUTEUR DU TRIANGLE ÉQUILATÉRAL


a) Diagonale du carré



$$d = a\sqrt{2}$$

$$d \approx 1,414 a$$


b) Hauteur du triangle équilatéral



$$h = a \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$h \approx 0,866 a$$

c) Une figure remarquable



$$\hat{B} = 30^\circ \quad AC = \frac{1}{2} BC$$

$$\hat{C} = 60^\circ \quad AB = BC \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$


EXEMPLE

Soit un triangle équilatéral dont les côtés mesurent 5 cm ; la hauteur de ce triangle est donnée par :


$$h = 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ soit } h = 4,33 \text{ cm.}$$

Exercices

- 1) La droite (TT') est tangente au cercle C de rayon 15 cm en T et au cercle C' de rayon 50 cm en T'. OO' = 90 cm. Calculer TT'.




- 2) La figure ci-dessous représente la section d'un réservoir ; quelle est la mesure de l'angle α ? Calculer le périmètre de la section (cotes en mm).



RELATIONS TRIGONOMETRIQUES DANS LE TRIANGLE RECTANGLE

1) RAPPELS



Soit un triangle ABC rectangle en A ; notons par commodité d'écriture B et C les mesures des angles : $\hat{A} \hat{B} C$ et $\hat{B} \hat{C} A$. On retiendra que :

$$\cos C = \frac{\text{mesure du coté adjacent}}{\text{mesure de l'hypoténuse}} = \frac{CA}{CB}$$

$$\sin C = \frac{\text{mesure du coté opposé}}{\text{mesure de l'hypoténuse}} = \frac{AB}{CB}$$

$$\tan C = \frac{\text{mesure du coté opposé}}{\text{mesure du coté adjacent}} = \frac{AB}{CA}$$


Vérifiez que $\cos B = \sin C$ et que $\sin B = \cos C$.

Exercice.

Vérifier que le triangle ABC tel que $AB = 8$, $AC = 15$, $BC = 17$ est rectangle en A; calculer $\cos B$, $\sin B$, $\tan B$; donner la mesure de l'angle ABC.

2) APPLICATIONS

a) Longueur et flèche d'une corde



Soit à calculer la longueur et la flèche de la corde $[AB]$; le rayon du cercle est 100 mm et $\hat{A} \hat{O} B = 72^\circ$.

Calcul de la longueur de la corde.

$AB = 2 AH$; calculons AH.

Dans le triangle OAH rectangle en H :

$$\hat{A} \hat{O} H = \frac{72}{2} = 36^\circ \quad \text{et} \quad \sin 36^\circ = \frac{AH}{OA} \quad \text{soit} \quad \sin 36^\circ = \frac{AH}{100}$$

d'où $AH = 100 \times \sin 36^\circ$ donc $AB = 200 \times \sin 36^\circ$

$AB = 117,56$ mm.

Calcul de la flèche.

La flèche f est la longueur HI;

$HI = OI - OH$; calculons OH.

Dans le triangle rectangle OAH


$$\cos 36^\circ = \frac{OH}{OA} \quad \text{soit} \quad \cos 36^\circ = \frac{OH}{100} \quad \text{d'où} \quad OH = 100 \times \cos 36^\circ$$

$$\text{donc : } HI = 100 - 100 \times \cos 36^\circ; HI = 19,1$$

$$f = 19,1 \text{ mm.}$$

b) Pente

Définition.



Soit un triangle ABC.

On appelle pente de la droite (BC) par rapport à la droite (AC) le rapport $\frac{AB}{AC}$ c'est-à-dire la tangente de l'angle $B \hat{C} A$


$$p = \tan C$$

EXEMPLES

1. Pente d'une route.

Dire qu'une route a une pente de 0,08 (ou de 8 %) cela veut dire que si (BC) représente la route, lorsque AC = 100 m alors AB = 8 m.

2. Pente d'une clavette ou d'une cale.




$$\text{La pente de la cale représentée par la figure est } p = \tan \alpha = \frac{11,3 - 7,8}{46,3} = \frac{3,5}{46,3}$$

$$p \approx 0,075 \text{ ou } 7,5 \text{ \%.}$$

3. Conicité.

Considérons la pièce conique représentée par la figure ci-dessous :



l'angle du cône est α ;


$$\text{la pente du cône est : } p = \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2h}$$

la conicité du cône est : $C = 2 p = \frac{D - d}{h}$


Exemple : si $D = 32$; $d = 26$; $h = 23$; la conicité est : $C = \frac{32 - 26}{23} = \frac{6}{23} = 0,26$ (ou 26%).

Exercices

1. Calculer l'angle α déterminé par les tangentes communes extérieures aux cercles C et C' de rayons $R = 20$ cm et $R' = 30$ cm ; $OO' = 90$ cm.




2. On considère la pièce tronconique représentée par la figure ci-dessous (cotes en mm) ;



calculer h ; quelle est la conicité de la pièce ?

3. Trois canalisations sont juxtaposées comme l'indique la figure ci-dessous.



1° Calculer α et h .

2° Calculer l'aire de la surface hachurée.


TRIGONOMÉTRIE APPLIQUÉE À LA MÉCANIQUE

I. FILETAGE À PROFIL ISO

DÉFINITION

Le profil ISO est défini à partir d'un triangle équilatéral de côté égal au pas et ayant sa base parallèle à l'axe du filetage.

Considérons la vis représentée sur la figure ci-dessous



Les éléments de la vis sont :


- le pas : p ;
- le diamètre nominal d ;
- le diamètre du noyau d₃.

Problème

On considère une vis de diamètre nominal d = 10 mm et de pas p = 1,5 mm. Calculer :

1. la cote H et la profondeur du filet H₁;
2. le diamètre d₃ du noyau et la section du noyau.

1. Calcul de H.



Dans le triangle équilatéral ABC, H = AI

d'où $H = BC \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ (hauteur du triangle équilatéral) donc $H = p \frac{\sqrt{3}}{2}$

soit : $H = 1,5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$; $H = 1,299 \text{ mm}$.

Calcul de H₁

$H_1 = JK = AI - AJ - KI$ soit $H_1 = H - \frac{H}{8} - \frac{H}{6} = \frac{24H - 3H - 4H}{24} = \frac{17}{24}H$

d'où : $H_1 = \frac{17}{24} \times 1,299$; $H_1 = 0,920 \text{ mm}$.

2. Calcul de d₃.

$\frac{d_3}{2} = \frac{d}{2} - 2H_1$ d'où : $d_3 = d - 4H_1$

soit : $d_3 = 10 - 4 \times 0,920$; $d_3 = 6,32 \text{ mm}$.

Calcul de la section du noyau.


La section du noyau est $s = \pi \frac{d_3^2}{4}$ soit $s = \pi \frac{(6,32)^2}{4}$
 $s = 31,6 \text{ mm}^2$.

Exercice.

Reprendre le problème précédent pour une vis de diamètre nominal d = 6 mm et de pas p = 1 mm.

CERCLE. ARC DE CERCLE

Longueur du cercle et d'un arc de cercle.



$$L = 2 \pi R \text{ ou } L = \pi D$$

$$l = \frac{\pi R d}{180}$$

L : longueur du cercle ; l : longueur de l'arc AB ; d : mesure en degrés décimaux de $A \hat{O} B$.

EXEMPLES

1. La longueur L d'un cercle de rayon 20 cm est donnée par : $L = 2 \pi \times 20 = 40\pi$

D'où : $L = 125,7$ cm.

2. La longueur l d'un arc de cercle de rayon 25 cm dont l'angle au centre d a pour 15° est :

$$l = \frac{\pi \times 25 \times 15}{180} = \frac{\pi \times 25}{12} \text{ soit : } l = 6,54 \text{ cm}$$

3. Calculer le rayon R d'un cercle dont la longueur est $L = 50$ cm.

$$L = 2 \pi R. \quad \text{soit } 50 = 2 \pi R. \quad \text{d'où : } R = \frac{50}{2 \pi} = \frac{25}{\pi}$$




$$R = 7,96 \text{ cm.}$$







Exercice.

1. Calculer le rayon d'un cercle de longueur 125 cm, puis la longueur d'un arc de 20° de ce cercle.
2. Calculer la longueur d'un arc de cercle sachant que $R = 1,50$ m et $d = 12^\circ 30'$.

AIRE DES SURFACES PLANES USUELLES

1 TABLEAU RÉCAPITULATIF

<u>Carré</u>	<u>Rectangle</u>	<u>Parallélogramme</u>
		
$A = a \times a = a^2$	$A = a \times b$	$A = a \times h_a$

<u>Triangle</u>  $A = \frac{a \times h_a}{2}$	<u>Triangle rectangle</u>  $A = \frac{a \times b}{2}$	<u>Losange</u>  $A = \frac{D \times d}{2}$
<u>Trapèze</u>  $A = \frac{(a + b) h}{2}$	<u>Disque</u>  $A = \pi \times R^2$	<u>Secteur circulaire</u>  $A = \frac{\pi \times R^2 \times d}{360}$

EXEMPLES

1. Un triangle ABC rectangle en A est tel que AB = 5 cm, AC = 8 cm; calculer l'aire du triangle et la mesure du segment [BC]; en déduire la mesure h de la hauteur issue de A.

Calcul de l'aire A du triangle.

$$A = \frac{1}{2} \times AB \times AC. \quad \text{soit } A = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 = 20 \text{ cm}^2.$$

Calcul de BC.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2. \quad \text{soit } BC^2 = 25 + 64 = 89$$


$$\text{d'où : } BC = \sqrt{89}; \quad BC = 9,43 \text{ cm.}$$

Calcul de h.

$$A = \frac{1}{2} \times h \times BC. \quad \text{soit } 20 = \frac{1}{2} \times h \times BC. \quad \text{d'où : } h = \frac{40}{BC}. \quad \text{soit } h = \frac{40}{9,43} \rightarrow h = 4,24 \text{ cm.}$$


Exercice .

1) Calculer l'aire du domaine colorié ; sachant que : R = 100 mm.



2) Soit un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon R = 15 cm

Calculer OH et l'aire de l'hexagone.




3) On note a la mesure des côtés d'un triangle équilatéral ;

- calculer l'aire de ce triangle en fonction de a .
- Quelle est la longueur du côté d'un triangle équilatéral d'aire 85 cm^2 ?

4) Sachant que l'aire d'un secteur circulaire d'angle au centre 45° est 150 cm^2 , calculer le rayon du cercle.


5) On considère la pièce représentée par la figure ci-dessous (cotes en mm),



Calculer :

- 1° la cote x ,
- 2° la cote y ,
- 3° la longueur DB et l'aire de la surface de pièce.

6) Calculer l'aire de la section de l'ébauche corps de bielle représentée par la figure ci-dessous.



VOLUME ET MASSE D'UN SOLIDE

1 VOLUME D'UN SOLIDE

a) Notion de volume

On admettra que. :

Si on associe le nombre un à un cube donné, on peut associer à tout solide un nombre appelé volume, mesure de ce solide.

b) Unités de volume

On choisit pour unité de volume, le volume d'un cube dont la longueur des arêtes est l'unité de longueur. L'unité principale est le mètre cube (m^3).

Les unités secondaires sont rappelées dans le tableau suivant

Symboles	km^3	hm^3	dam^3	dm^3	cm^3	mm^3
Valeur en m^3	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

EXEMPLES

$$284\,379 \text{ dm}^3 = 284,379 \text{ m}^3 = 0,284\,379 \text{ dam}^3 = 0,000\,284\,379 \text{ hm}^3$$

$$0,0471 \text{ m}^3 = 47,1 \text{ dm}^3 = 47\,100 \text{ cm}^3 = 47\,100\,000 \text{ mm}^3.$$

REMARQUE

On appelle capacité d'un récipient le volume du solide représenté par ce récipient ; l'unité principale est le litre : $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$; les unités secondaires sont des multiples décimaux et sous-multiples décimaux du litre.

2. MASSE VOLUMIQUE D'UN CORPS

a) Définition

La masse volumique d'un corps est la masse de l'unité de volume de ce corps.

L'unité légale est le kilogramme par mètre cube (kg/m^3).

On utilise aussi le gramme par centimètre cube (g/cm^3) ou le kilogramme par décimètre cube (kg/dm^3) ou la tonne par mètre cube (t/m^3).

On retiendra que : $1\text{ g/cm}^3 = 1\text{ kg/dm}^3 = 1\text{ t/m}^3$

b) Calcul de la masse d'un corps

Soit un solide de volume égal à V et soit ρ la masse volumique de la matière qui le constitue.

La masse M du solide est, en utilisant les unités convenables

$$M = \rho \times V$$

EXEMPLES


1. La masse d'une pièce de fonte (masse volumique $7,5\text{ g/cm}^3$) ayant un volume de $27,6\text{ cm}^3$
 $M = 7,5 \times 27,6 = 207\text{ g}$.
2. L'essence ayant une masse volumique de $0,72\text{ kg/dm}^3$, la masse d'essence contenue dans un réservoir de capacité 50 l
 $M = 0,72 \times 50 = 36\text{ kg}$ (on utilise ici le fait que $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$).

Exercice

- 1) Un solide de masse volumique $2\,700\text{ kg/m}^3$ a un volume de 450 cm^3 . Quelle est sa masse ?
2. Une pièce en acier (masse volumique $7\,700\text{ kg/m}^3$) a une masse de $1,450\text{ kg}$; calculer son volume.


VOLUMES DES PRISMES ET PYRAMIDES

1) Parallélépipède rectangle




$$V = a \times b \times c$$

2) Cube



$$V = a \times a \times a$$


3) Prisme droit



$$V = B \times h$$

B : Aire de base
h = hauteur

4) Pyramide




$$V = \frac{1}{3} B \times h$$

B : Aire de base

h = hauteur

5) Tronc de pyramide



$$V = \frac{h}{3} (B + \sqrt{B B'} + B')$$

B et B' : Aire de base

h = hauteur

EXEMPLES


2. Une pyramide dont la hauteur est 4 cm a une base rectangulaire de dimensions 35 mm et 21 mm. Calculer son volume.

L'aire de la base est $B = 35 \times 21 = 735 \text{ mm}^2 = 7,35 \text{ cm}^2$

et
$$V = \frac{B \times h}{3} = \frac{7,35 \times 4}{3} = 9,8 \text{ cm}^3.$$


EXERCICES

- 1) Quel est le volume du parallélépipède rectangle dont les longueurs des arêtes sont égales à 40 mm, 5 cm et 21 mm.
- 2) Une pyramide régulière a pour hauteur h et pour base un losange dont les mesures des diagonales sont D et d; calculer son volume si h = 24 cm, D = 20 cm, d = 16 cm.
- 3) La pièce représentée par la figure ci-dessous est un tronc de pyramide régulier dont les bases sont des carrés et dont les faces latérales ont une pente de 15 % (cotes en mm).



- Calculer la masse de cette pièce sachant qu'elle est en fonte de masse volumique $7,2 \text{ g/cm}^3$.

4) Une poutrelle d'acier a une section représentée par la figure ci-dessous (cotes en mm).




Sa longueur est 2,5 m; calculer sa masse sachant que la masse volumique est $7\,800 \text{ kg/m}^3$.

CYLINDRE ET CÔNE DE RÉVOLUTION, SPHÈRE ET BOULE

1 CYLINDRE DE RÉVOLUTION

a) Aire de la surface latérale d'un cylindre de révolution



$$A = 2\pi R h$$

b) Volume du cylindre de révolution

$$V = \pi R^2 h$$

EXEMPLE

Calculer l'aire totale et le volume d'un cylindre de révolution tel que $R = 5 \text{ cm}$; $h = 10 \text{ cm}$.

1. Calcul de l'aire totale.

L'aire latérale est $A = 2\pi \times 5 \times 10$. soit $A = 314 \text{ cm}^2$.

L'aire A_l d'un disque de base est telle que $A_l = \pi R^2 = \pi \times 25$.


L'aire totale est $S = 2 A_l + A = 157 + 314 = 471 \text{ cm}^2$.

2. Calcul du volume.

$$V = \pi R^2 h. \quad \text{soit : } V = \pi \times 25 \times 10; \quad V = 785 \text{ cm}^3.$$

2 CÔNE DE RÉVOLUTION

a) Aire de la surface latérale d'un cône de révolution




Elle est égale à l'aire du secteur circulaire d'angle au sommet de mesure θ et de rayon a .
 R (rayon du cercle de base).

$$\text{d'où } A = \pi a^2 \times \frac{\theta}{360} = \pi a^2 \times \frac{R}{a}$$

soit $A = \pi R a$

b) Volume d'un cône de révolution



On admettra, B désignant l'aire du disque de base, h la hauteur du cône, que

$$V = \frac{1}{3} B h = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

EXEMPLE

Soit un cône de révolution dont le demi-angle au sommet mesure 30° et dont l'apothème est égale à 10 cm

1. Calculer le rayon et la mesure de l'angle de développement.
2. Calculer l'aire latérale et l'aire totale du cône.
3. Calculer la hauteur et le volume du cône.

Réponse

1. Dans le triangle rectangle SOA, $\widehat{OSA} = 30^\circ$ donc $SA = 2 \times OA = 2 R$ d'où $R = \frac{a}{2} = 5 \text{ cm}$.

L'angle de développement est $\theta = 360 \times \frac{R}{a} = 360 \times \frac{5}{10} = 180^\circ$.

2. L'aire latérale est $A = \pi R a = \pi \times 5 \times 10$. soit $A = 157 \text{ cm}^2$.

L'aire du disque de base est $A_1 = \pi R^2 = \pi \times 25$ soit $A_1 = 78,5 \text{ cm}^2$.

L'aire totale est $S = A_1 + A$ donc $S = 157 + 78,5 = 235,5 \text{ cm}^2$.

3. Dans le triangle rectangle SOA, $SO = SA \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc la hauteur du cône est :


$$h = a \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad h = 10 \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{soit } h = 8,66 \text{ cm.}$$

Le volume du cône est $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \times 25 \times 8,66$ d'où $V = 226,7 \text{ cm}^3$.

c) Complément : Tronc de cône de révolution

$$A = \pi a (R + R')$$

$$V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + R'^2 + RR')$$



SPHÈRE ET BOULE

1. DEFINITIONS

a) Sphère (fig.1)




fig.1

On appelle sphère de centre O et de rayon R l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM = R$.

b) Boule (fig.1)

On appelle boule de centre O et de rayon R l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM \leq R$.

2. AIRE DE LA SPHÈRE VOLUME DE LA BOULE

a) Aire de la sphère


$$A = 4 \pi R^2$$

b) Volume de la boule

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

3 CALOTTE SPHÉRIQUE. SEGMENT SPHÉRIQUE

a) Calotte sphérique



Si h désigne la hauteur de la calotte, l'aire de la calotte est :

$$A = 2\pi R h$$

b) Segment sphérique

Le segment sphérique est le solide compris entre une calotte sphérique et son cercle base

Le volume V du segment sphérique à une base est :

$$V = \frac{\pi h^2}{3} (3R - h)$$

EXEMPLE

Soit une sphère de rayon 20 cm.

L'aire de la sphère est $A = 4\pi R^2 = 4\pi \times (20)^2$ soit $A = 5\,027 \text{ cm}^2$.

Le volume de la boule est $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times (20)^3$ soit $V = 33\,510 \text{ cm}^3$.

L'aire d'une calotte sphérique de hauteur $h=5 \text{ cm}$ est $A' = 2\pi R h = 2\pi \times 20 \times 5$

soit $A' = 628 \text{ cm}^2$

Le volume du segment sphérique est $V = \frac{\pi h^2}{3} (3R - h) = \frac{\pi \times 25}{3} (60 - 5)$

soit $V = 1\,440 \text{ cm}^3$.

EXERCICES

1) On considère une sphère de rayon 35 cm; calculer

- l'aire de la sphère et le volume de la boule ;
- l'aire d'une calotte sphérique et le volume d'un segment sphérique de hauteur 8 cm

2) Une éprouvette cylindrique de diamètre intérieur 50 mm est graduée de 10 cm^3 en 10 cm^3 .


Quelle est la distance séparant 2 traits consécutifs de la graduation ?

3) On fait tourner un carré ABCD de côté a autour de la diagonale [AC].

Déterminer, en fonction de a , l'aire et le volume du solide de révolution engendré.

Application numérique $a = 12 \text{ cm}$.

4) On considère la pièce de révolution représentée figure 10 (côtes en mm).



Calculer


- 1° L'aire et le volume de la partie hémisphérique.
- 2° L'aire latérale et le volume de la partie cylindrique.
- 3° L'aire latérale et le volume de la partie conique.
- 4° L'aire totale et le volume de cette pièce.

VECTEUR. TRIANGLE QUELCONQUE

1 VECTEUR. SOMME DE DEUX VECTEURS

a) Vecteur

Considérons un couple de points ou bipoint (A, B) et un point O




Construisons les images A' et B' de B et A dans la symétrie de centre O ; les bipoints (A, B) et (A', B') ont des supports parallèles, même direction et $AB = A'B'$. On dit qu'ils représentent le même vecteur $\overrightarrow{AB}$. On écrit :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$$

b) Somme de deux vecteurs


Soit les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ et O un point quelconque.



$$\begin{aligned} \text{Si } \overrightarrow{OA} = \vec{U} \text{ et } \overrightarrow{AB} = \vec{V} \\ \text{alors } \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \text{ ou } \overrightarrow{OB} = \vec{U} + \vec{V} \end{aligned}$$

c) Projection de la somme de deux vecteurs

Considérons la figure suivante :




Les projections orthogonales de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{AB}$ sur l'axe Ox sont respectivement $\overrightarrow{OH}$, $\overrightarrow{HK}$, $\overrightarrow{OK}$

Notons que : $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OK} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HK}$,

On énonce :

La projection orthogonale sur un axe de la somme de deux vecteurs est égale à la somme des projections de chacun de ces vecteurs.

2 RELATIONS TRIGONOMÉTRIQUES DU TRIANGLE QUELCONQUE



Notons a, b, c les mesures des côtés $[BC], [CA], [AB]$ du triangle ABC .
On admettra les relations suivantes :

Côtés et cosinus des angles opposés aux côtés

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$


$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Côtés et sinus des angles opposés aux côtés

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} ; A + B + C = 180^\circ$$

EXEMPLE

Soit un triangle ABC tel que $A = 36^\circ$; $b = 85$ mm; $c = 54$ mm.



Calcul de a .

On écrit $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ soit $a^2 = 7\,225 + 2\,916 - 2 \times 85 \times 54 \times \cos 36^\circ$.

A l'aide de la calculatrice on obtient : $a^2 = 2714,22$ d'où $a = \sqrt{2\,714,22}$; $a = 52,1$ mm.

Calcul de $B \hat{C} A$.

On écrit : $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$ soit $\frac{54}{\sin B} = \frac{52,1}{\sin A}$

d'où : $\sin B = \frac{54 \sin 36}{52,1} = 0,6092$; $B = 37,53^\circ$ ou $37^\circ 32'$.

On en déduit : $C = 180 - (36 + 37^\circ 32') = 106^\circ 28'$.

EXERCICES

1) On considère un triangle ABC tel que $AB = 4$; $BC = 5,6$; $B = 80^\circ$. Calculer AC et BAC .

2) On donne deux forces concourantes ayant pour intensité 45 N et 70 N.


Elles délimitent un angle de 43° .

Calculer l'intensité de la somme $\vec{F}$ des deux forces et l'angle que fait $\vec{F}$ avec chacune d'elles.

3) Les côtés OA et OB d'un parallélogramme mesurent respectivement 8,5 cm et 4 cm et définissent avec

Ox des angles de mesures respectives 30° et 60° .

Les points A et B se projettent orthogonalement sur Ox suivant H et K.




1° Calculer AH, OH, BK, OK.

2° Calculer OR sachant que $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

3° Calculer OR directement sans utiliser les questions 1 et 2.


EXERCICES :

1.




Dans l'essai de pénétration ci-dessus, calculer la hauteur X

2.



Dans le vé de centrage ci-dessus, calculer la cote Z.


3.



Dans le gabarit ci-dessus, calculer :

- La longueur BH
- L'angle α
- La cote Y
- La cote de vérification X (piges $\Phi 35$)


4.



Dans le vé à entaille ci-dessus, calculer :

- 1) La longueur BC
- 2) La longueur AI
- 3) La longueur AO
- 4) La cote de vérification X

5.




Dans l'épure ci-dessus, calculer :

- a. La longueur BD.
- b. La longueur AE.
- c. La position $X = ?$
- d. On perce un trou $\Phi 20$, à la vitesse de coupe de 32 m/min, quelle est la fréquence de rotation à utiliser ?
- e. Le temps de perçage, si l'avance est de 0.2mm/tour ?

NOTE : Les vitesses disponibles sur perceuse sont :

215 — 280 — 375 — 500 — 670 et 900 tours/min.


6.



On donne une entaille de 30° .

Un carré dont la base se trouve à 30mm de la partie supérieure de l'ouverture, trouver le côté du carré AB

7.



Dans l'équerre ci-dessus, calculer la longueur de l'arc BD.

Exercice 1 : DEBIT ECONOMIQUE

On nous commande 27 pièces 660 x 222.5.

Sachant que l'on utilise de la tôle de format 2000 x 1000, déterminer le pourcentage de chutes global.

**Exercice 2 : DEBIT ECONOMIQUE**


On nous commande 27 pièces 660 x 222.5.

Sachant que l'on utilise 2 tôles de 2000 x 1000, et une chute de l'atelier de 700 x 670, déterminer le pourcentage de chutes global.


**Exercice 3 : DEBIT ECONOMIQUE**

On désire découper 50 pièces rep1 et 90 pièces rep2 suivant croquis ci-dessous dans des tôles TC de 2500 x 1250 x 3.

1. Rechercher le débit économique par étude de la mise en feuille.
2. Calculer le pourcentage de chute.



(ép. 3 mm)




(ép. 3 mm)

Exercice 4 : CALCUL DE DEBIT

On doit découper avec une CIG de capacité 3000 x 4, 800 pièces conformes au plan ci-dessous.

E = 3 mm



Les formats disponibles chez le fournisseur sont les suivants :

1000 x 2000
1250 x 2500
1000 x 3000
1500 x 3000
1000 x 4000
2000 x 4000


Recherchez le format idéal, celui qui donnera le plus faible pourcentage de chutes pour réaliser ces 800 pièces.

Remplissez le bordereau de mise en tôles et faites apparaître le format de tôle choisi.

Exercice 5 : CALCUL DE DEBIT

Matière : acier E 24

Ep. : 3 mm




1. Calculer le poids de 1700 pièces
2. Complétez le bordereau de mise en tôle (pour une commande de 1700 pièces)
3. Justifiez vos résultats

Exercice 6 : CALCUL DE DEBIT

Matière : acier S235JR

Ep. : 3 mm




1. Calculez le poids de 1700 pièces
2. Complétez le bordereau de mise en tôle (pour une commande de 1700 pièces)
3. Justifiez vos résultats

Tôle de : 2000 x 1000
 2500 x 1250
 3000 x 1500
 3000 x 1000
 4000 x 1000
 4000 x 2000

Exercice 7 : ANGLE OUVERT

Déterminer :


l'angle β de la courbe à souder.
 les longueurs droites des tubes X et Y .



Exercice 8 : ANGLE FERME


Déterminer :

l'angle β de la courbe à souder.
les longueurs droites X et Y du tube.



Exercice 9 :

Soit la pièce ci-dessous :



1. Calculer la longueur développée du tracé d'oxycoupage.
2. Calculer l'aire du domaine hachuré.

Exercice 10 :


Calculer :

La mesure des angles $\widehat{AIM}$ et $\widehat{BOC}$ (à 10' près).

La mesure des angles $\widehat{KJL}$ et $\widehat{DO'E}$ (à 10' près) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{JKL}$.


La mesure de l'angle $\widehat{FO'G}$.

La longueur développée du tube.



Exercice 11 :

On a la soudure de cet élément à réaliser



Pour la réaliser, on effectue 2 passes :

- 1^{ère} passe avec électrode $\varnothing 2,5$ – longueur de métal déposée par une électrode = 160 mm.
- 2^{ème} passe avec électrodes $\varnothing 4$ – longueur de métal déposée par une électrode 60% de plus que le $\varnothing 2,5$.

A/ Quel est le nombre d'électrodes total utilisé ?

Pour effectuer ces 2 passes, le soudeur met 120 minutes (temps de soudage + arrêts).

Pour la 1^{ère} passe, le temps total mis est de 4200 secondes, sachant qu'avec l'électrode de $\varnothing 4$ la cadence du soudeur est de 60%.

B/ Combien de temps a duré la soudure (en $\varnothing 4$) ?

Exercice 12 :

Pour le soudage d'un ensemble chaudronné, on utilise des électrodes non alliées à enrobage rutile à haut rendement (rendement effectif moyen : 135 %)

La masse déposée par électrode est de 36 g.

La vitesse de soudage est de 29,6 g/mn.


Sachant qu'un étui contient 85 électrodes et que l'on utilise les 3/5 :

- 1- Calculer le poids de métal déposé.
- 2- Le temps de soudage nécessaire à la réalisation.

Exercice 13 :

Un dessus de table de jardin est conforme au croquis. Les centres des courbes sont les sommets du triangle équilatéral ABC.


1. Calculer son poids, sachant que la tôle où il a été découpé pèse 39 kg au m².



Exercice 14 :

Une pièce ayant la forme représentée par le croquis a été découpée dans une plaque de tôle rectangulaire de 0,50 m sur 0,35 m.

- 1- Calculer l'angle $\widehat{COM}$ et la longueur CB.
- 2- Calculer la surface de la plaque.
- 3- Quel est, par rapport à la plaque de tôle primitive, le pourcentage de tôle perdue ?

**Exercice 15:**

Un chapeau de cheminée a la forme d'un cône droit ; sa hauteur est égale à 135 mm, son diamètre de base à 360 mm. L'assemblage est fait par soudure autogène, c'est à dire sans recouvrement.

On demande de calculer :

- 1/ la longueur de la génératrice du cône ;
- 2/ l'angle de développement (en degrés) ;
- 3/ Le poids de ce chapeau, sachant qu'il est fait en tôle de 2 mm d'épaisseur dont la densité est 7,7.